

**Kan man dricka alkohol när man använder plåster med rivastigmin?** Du bör undvika alkohol eftersom alkohol kan orsaka att effekten av rivastigmin blir sämre.

**Vilka receptfria läkemedel mot värk och feber kan man ta med rivastigmin?** För att lindra tillfällig värk och feber kan du ta läkemedel som innehåller paracetamol (t ex Panodil, Alvedon). Detta under förutsättning att du inte redan använder läkemedel på recept som innehåller paracetamol (t ex Citodon, Panodil, Alvedon). Undvik läkemedel innehållande ibuprofen (t ex Ipren, Ibumetin), diklofenak (t ex Voltaren), acetylsalicylsyra (t ex Treo) om du inte blivit rekommenderad dessa av läkare.

**Hur ska plåstren förvaras?** Förvaring ska ske i rumstemperatur. Förvara plåstren i plåsterkuverten tills de ska användas.

**Hur ska plåstren kastas?** Efter att plåstret har tagits bort, vik det dubbelt med den självhäftande sidan inåt. Lägg tillbaka det använda plåstret i plåsterkuvertet och lämna till apoteket. Om din hemkommun bränner hushållsavfall kan du kasta plåstret tillsammans med hushållsavfallet.

Informationsblad om läkemedel som innehåller:

## Rivastigmin (plåster)

### Hur verkar läkemedel som innehåller rivastigmin?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för minne och inlärning.

### Vilken effekt kan man förvänta sig?

Läkemedlet botar inte, men kan förbättra minnet, tankeförmågan och uppmärksamheten. Även förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten kan dock variera från person till person, varför regelbunden uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen har gjort nytta.

### Hur ska man använda plåster som innehåller Rivastigmin?

- På apoteketiketten står vilken dos du ska ta.
- Plåstret ska bytas en gång om dagen, vid samma

tidpunkt varje dag. Ta bort föregående dags plåster innan du sätter på ett nytt.

- Använd bara ett plåster i taget.
- Plåstret ska fästas på ren, torr (och fri från hudlotion), hårfri, oskadad hud på övre eller nedre delen av ryggen, överarmen eller bröstkorgen (undvik själva bröstet). Plåstret ska fästas på ett nytt ställe varje dag.
- Klipp inte i plåstret.
- Du kan behålla plåstret på vid dusch och bad. Var försiktig med att utsätta plåstret för yttre värme under längre tid (t ex solande, bastu).
- Se bruksanvisning i förpackningen för detaljerad information om hur du bör använda plåstret.

## **Vilka biverkningar kan plåster med Rivastigmin ge?**

En del personer får biverkningar av Rivastigmin.

Besvärerna varierar från person till person.

Biverkningar kan till exempel vara illamående, kräkningar och aptitförlust. Som regel är dessa biverkningar övergående. Somliga personer får hudirritationer av plåster med rivastigmin. Om du

besväras av någon biverkan som inte går över, kontakta din läkare/sjuksköterska.

### **Vad gör man om man:**

- **Glömt att byta plåster?** Om du upptäcker att du har glömt att byta plåster, sätt på ett nytt omedelbart. Glöm inte att ta bort det gamla. Du kan sedan byta plåster i vanlig tid nästa dag. Sätt inte på två plåster för att kompensera för ett glömt plåster. Om du glömmer bort att använda plåster under flera dagar, sätt inte på något nytt plåster innan du har kontaktat din läkare. Kontakta även din läkare/sjuksköterska om du ofta glömmer att använda dina plåster. Det finns möjlighet att få hjälp med medicinutdelning. Om det hjälper dig att komma ihåg om du bytt plåster kan du anteckna veckodag på plåstret med en kulspetspenna. Du kan även anteckna på ett schema när du bytt plåster.
- **Använt för hög dos?** Om du oavsiktligt satt på fler än ett plåster, ta av alla plåstren från huden och ta kontakt med din läkare/sjuksköterska.
- **Ett plåster faller av?** Om ett plåster faller av, sätt på ett nytt för resten av dagen, byt sedan till ett nytt igen vid den vanliga tiden nästa dag.