

att ta din medicin under flera dagar, ta inte nästa dos innan du har kontaktat din läkare. Kontakta även din läkare/sjuksköterska om du ofta glömmer att ta din medicin. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett och/eller medicinutdelning.

- **Tagit dubbel dos?** Hoppa över den nästkommande ordinarie dosen, fortsätt sedan som vanligt. Känner du något obehag ska du kontakta läkare.

Hur ska läkemedel som innehåller galantamin förvaras?

Dessa läkemedel ska förvaras i rumstemperatur.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

Olika namn, samma verkan

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt samma verksamma ämne.

Informationsblad om läkemedel som innehåller Rivastigmin (depotkapslar)

Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda Rivastigmin Orifarm kapslar i styrkorna 1,5 mg, 3 mg eller 6 mg, eftersom de innehåller sojalecitin.

Hur verkar läkemedel som innehåller Rivastigmin?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för minne och inlärning.

Vilken effekt kan man förvänta sig?

Läkemedlet botar inte, men kan förbättra minnet, tankeförmågan och uppmärksamheten. Även förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten kan dock variera från person till person, varför regelbunden uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen har gjort nytta.

Hur ska man ta läkemedel som innehåller galantamin?

- På apoteketiketten står vilken dos du ska ta.
- Depotkapslar innehållande Rivastigmin tas två gånger om dagen, vid samma tidpunkt varje dag.
- Kapslarna är utformade som depotkapslar, vilket innebär att det verksamma ämnet frisätts i långsam takt i tarmen. Därför ska kapslarna sväljas hela, och får inte tuggas eller krossas.
- Det är bra att ta läkemedlet tillsammans med mat, för att minska eventuella magbesvär.
- Kapslar brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk vätska.

Vilka biverkningar kan Rivastigmin ge?

En del personer får biverkningar av Rivastigmin. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan till exempel vara illamående och/eller kräkningar, lös avföring, och dålig aptit. Som regel är dessa biverkningar övergående. Om du besväras av någon biverkan som inte går över, kontakta din läkare/sjuksköterska.

Kan man dricka alkohol när man tar

Rivastigmin?

Du bör undvika alkohol eftersom alkohol kan orsaka att effekten av galantamin blir sämre.

Vilka receptfria läkemedel mot värk och feber kan jag ta med Rivastigmin?

För att lindra tillfällig värk och feber kan du ta läkemedel som innehåller paracetamol (t ex Panodil, Alvedon). Detta under förutsättning att du inte redan använder läkemedel på recept som innehåller paracetamol (t ex Citodon, Panodil, Alvedon). Undvik läkemedel innehållande ibuprofen (t ex Ipren, bumetin), diklofenak (tex Voltaren), acetylsalicylsyra (t ex Treo) om du inte blivit rekommenderad dessa av läkare.

Vad gör man om man:

- **Glömt ta en dos?** Om du glömmer bort att ta en kapsel, ta en kapsel vid nästa dostillfälle vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du glömmer bort