

**ASSOCIERADE SYMPTOM**

- 1   Stresskänslighet
- 2   Depression
- 3   Ångest
- 4   Sömnstörning
- 5   Emotionell instabilitet
- 6   Aggressivitet
- 7   Vanföreställningar
- 8   Hallucinos
- 9   Konfusion
- 10   Frånvaro

**MINNE**

- 1   Närminne
- 2   Prospektivt minne
- 3   Fjärrminne
- 4   Tidsuppfattning
- 5
- 6
- 7

Σ: \_\_\_\_\_ p (max 14p)

DURATION : 

--	--	--	--	--	--

  
< ½ år ½ - 1 år 1 - 2 år 2 - 3 år 3 - 5 år > 5 år

DEBUT (NÄR/HUR) : .....

DEBUTSYMPTOM: .....

FÖRLOPP : ..... FLUKTUATION ? .....

ANHÖRIGBELASTNING ? ..... PAT:S UPPLEVELSE: .....

ÖVRIGT : .....

SAMMANFATTNING / ANALYS : .....

ANHÖRIG : ..... LÄKARE : .....

*Exempel på grafiskt arbetssätt vid sammanställning:*

- Nej (0)            grön   grön    (0p)
- Något (1)        röd   ofärgad (1p)
- Uttalat (2)       röd   röd        (2p)
- Vet ej (X)        ofärgad   ofärgad (0p)

*Det är lämpligt att sammanställningen inkluderas i patientens journal, varefter enkätbladen kan makuleras.*

©Ragnar Åstrand, överläkare  
 Minnesmottagningen  
 Medicinkliniken  
 Centralsjukhuset  
 651 85 Karlstad

[ragnar.astrand@liv.se](mailto:ragnar.astrand@liv.se)